

MÉGESTROL

Autre NOM : Megace®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le mégestrol est un médicament semblable à l'hormone progestérone que l'on retrouve naturellement dans l'organisme. Le mégestrol peut améliorer l'appétit et favoriser le gain de poids lorsqu'il est utilisé avec un régime approprié.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le mégestrol est présenté sous forme d'un comprimé bleu à 40 mg, d'un comprimé blanc à 160 mg ou d'une suspension orale. Il est habituellement pris une ou deux fois par jour. Puisque chaque personne répond différemment aux traitements médicaux, votre médecin vous recommandera la dose et la durée du traitement qui vous conviennent le mieux.

La dose habituelle pour augmenter l'appétit et favoriser le gain de poids est de 400 à 800 mg par jour.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 40 mg
- comprimé à 160 mg

_____ comprimé (_____mg) _____fois par jour

ou

suspension orale à 40 mg / mL:

_____mL (_____mg) _____fois par jour

Le mégestrol peut être pris avec ou sans nourriture. Bien agiter le flacon de suspension orale avant chaque dose.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de mégestrol, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Le mégestrol peut causer les effets indésirables suivants : **anxiété, difficulté à se concentrer, diarrhée et gaz.** Certaines personnes présentent aussi une **enflure** (des pieds, des chevilles et du bas des jambes), **une constipation, un besoin fréquent d'uriner, une insomnie, des maux de tête, des nausées, des vomissements et des saignements menstruels anormaux**

(taches).

Ces effets peuvent disparaître à mesure que votre organisme s'ajuste au médicament. Toutefois, avisez votre médecin si ces effets persistent ou deviennent incommodants.

De rares cas d'une élévation du taux de sucre dans le sang, d'impuissance ou d'un effet sur les surrénales ont été observés avec l'utilisation prolongée de mégestrol.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre le mégestrol, avisez votre médecin si vous avez le diabète, une intolérance au glucose, le syndrome de Cushing, avez ou avez déjà eu un cancer ou des caillots de sang.

Le mégestrol peut entraver l'action d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits ou non que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau

médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

L'utilisation du mégestrol durant la grossesse ou l'allaitement n'est PAS recommandée. Consultez votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet. Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devriez toujours utiliser une méthode contraceptive adéquate (pilule contraceptive, condom) pour éviter la grossesse durant le traitement par mégestrol. De façon générale, même si vous ne prenez pas le mégestrol, l'utilisation de condoms est toujours recommandée pour réduire le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le mégestrol devrait être entreposé dans un endroit frais et sec (15-30 °C) à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder dans la salle de bain ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets

indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone: _____

Référence : Monographie de Megace® (acétate de mégestrol). Montréal, Qc, Canada : Laboratoires Bristol du Canada, 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

MÉGESTROL

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***