

# RILPIVIRINE

**Autre NOM:** Edurant™

## POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Rilpivirine est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Il est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux pour le traitement du VIH-1 chez les patients adultes qui n'ont jamais pris de médicaments anti-VIH (patients adultes naïfs de traitement). Il peut également être utilisé conjointement avec d'autres antirétroviraux dans chez les patients adultes prétraités, qui ont échoué une thérapie antérieure, et ont le VIH-1 des souches qui sont résistantes aux antirétroviraux d'autres et les INNTI. Rilpivirine est utilisé pour retarder la progression de l'infection à VIH.

Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4+) et vous serez mieux protégé contre les infections.

Rilpivirine ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de la rilpivirine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose habituelle est de 25 mg une fois par jour, avec un repas. Rilpivirine doit toujours être pris avec un repas standard ou haute teneur en matières grasses avec d'autres antirétroviraux.

Votre dose est:

25 mg comprimés blancs

\_\_\_\_ Comprimé (s) (\_\_\_\_ mg) une fois par jour

## Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous manquez une dose de rilpivirine, et il est de moins de 12 heures depuis l'heure dite prenez-la dès que possible, avec un repas, puis prenez la dose suivante à l'heure prévue. Toutefois, si elle est plus de 12 heures depuis que vous avez manqué votre dose, ne prenez pas de dose jusqu'à ce que votre prochaine dose régulièrement programmée.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous manquez des doses de rilpivirine, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour rilpivirine de cesser d'être actif, qui est un phénomène connu sous le nom de **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux qui travaillent d'une manière similaire à celle rilpivirine peut aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, manque de doses de rilpivirine peut diminuer les options de traitement pour l'avenir.** S'il vous plaît ne vous arrêtez pas rilpivirine sans en parler à votre médecin d'abord

## Quel EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Certaines personnes qui prennent rilpivirine peuvent développer une éruption bénigne à modérée. Informez immédiatement votre médecin si vous développez une éruption cutanée en prenant rilpivirine. Dans la plupart des cas, l'éruption peut être traitée avec des anti-inflammatoires ou des antihistaminiques. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre des médicaments pour traiter

l'éruption.

Si vous développez une éruption cutanée sévère, ou une éruption cutanée accompagnée de symptômes tels que fièvre, formation de cloques, plaies dans la bouche, les yeux rouges, le gonflement, douleurs musculaires ou articulaires et une sensation générale de malaise, **CESSEZ** de prendre rilpivirine. **Parlez avec votre médecin immédiatement.**

Certaines personnes qui prennent rilpivirine peuvent souffrir de dépression ou de sautes d'humeur. Contactez votre médecin si vous ressentez des symptômes de tristesse ou de désespoir, des pensées de se blesser, d'anxiété ou de nervosité, ou ont eu des luttes antérieures avec la dépression.

Autres effets secondaires des gens d'expérience comprennent des maux de tête, troubles du sommeil, et des changements dans la répartition des graisses du corps.

Votre médecin effectuera des analyses de sang régulièrement pour voir s'il ya des changements dans votre fonction hépatique, le taux de cholestérol et de triglycérides.

**Il est important que vous gardiez vos rendez-vous chez le médecin et pour vos tests de laboratoire afin que tes progrès peuvent être suivis.**

## Quelle autre PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer que vous prenez la bonne dose. Si vous prenez des doses plus élevées de rilpivirine que ce qui est prescrit, vous pouvez augmenter la chance d'avoir des effets néfastes. Si vous prenez des doses plus faibles de rilpivirine que ce qui est prescrit, le virus du VIH peut devenir résistant à rilpivirine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou

diminuer l'effet de la rilpivirine.

Les médicaments suivants ne doivent pas être pris avec rilpivirine:

- Les anticonvulsivants (carbamazépine, l'oxcarbazépine, le phénobarbital, la phénytoïne)
- Rifamycines (rifampine, rifabutine, la rifapentine)
- Les inhibiteurs de la pompe à protons (p. ex. ésooméprazole, lansoprazole, l'oméprazole, le pantoprazole, rabéprazole)
- Dexaméthasone systémique (plus d'une dose unique)
- Le millepertuis (*Hypericum perforatum*)

En outre, rilpivirine peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez. En outre, vous devez les informer de produits naturels ou de loisirs (rue) les médicaments que vous prenez. Si vous souhaitez commencer un nouveau médicament ou un produit naturel, s'il vous plaît consulter votre pharmacien avant de le faire.

Rilpivirine devrait pas être pris si vous êtes enceinte. S'il vous plaît informer votre médecin si vous croyez que vous êtes enceinte ou si vous désirez devenir enceinte dans un avenir proche. Votre médecin peut vous recommander un traitement approprié pour aider à réduire le risque de transmission du virus VIH à votre bébé. Un registre a été créé pour suivre les patients qui sont exposés à rilpivirine pendant la grossesse. Votre médecin peut vous inscrire en téléphonant au 1-800-258-4263. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous avez le VIH, comme vous pouvez transmettre le virus à votre bébé par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

Rilpivirine doivent être stockés dans un endroit frais (15-30 ° C) et sec, protégé de la lumière et

hors de la portée des enfants, dans son flacon d'origine. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date d'expiration («EXP») indiquée sur l'extérieur de l'emballage. Ne retirez pas les packs déshydratants petites inclus avec votre médicament.

Ne pas entreposer dans votre salle de bains ou la cuisine, sous forme de chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, s'il vous plaît en discuter avec votre pharmacien, votre médecin ou une infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations vers le bas pour assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien suivant est disponible pour répondre aux questions:

**Pharmacien(ne):** \_\_\_\_\_  
**Téléphone:** \_\_\_\_\_

Référence: Monographie du produit Edurant™ (rilpivirine). Janssen-Ortho Inc., Toronto, ON, Canada: 2011. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2012.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour dur les médicaments peuvent être consultés dur le site: [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***RILPIVIRINE***

***(EDURANT™)***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***