

AZITHROMYCINE

Autre nom : Zithromax^{MC}

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'azithromycine est un médicament anti-infectieux (antibiotique) utilisé pour prévenir ou traiter l'infection à complexe *Mycobacterium avium* (MAC). L'azithromycine peut aussi être utilisée pour traiter d'autres sortes d'infections telles que la pneumonie bactérienne, la toxoplasmose, et les maladies transmises sexuellement (chlamydia).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La dose d'azithromycine variera en fonction du type d'infection dont vous souffrez. Par exemple, la dose habituelle d'azithromycine utilisée pour **prévenir l'infection à MAC** est de 1200 mg par la bouche, une fois par semaine. D'autres doses peuvent aussi être prescrites.

Lorsqu'elle est utilisée en association avec d'autres médicaments pour le **traitement de l'infection à MAC**, sa dose habituelle est de 500 mg par jour.

Pour les pneumonies bactériennes, le médicament est prescrit pendant 5 jours, et pour les infections à chlamydia, on administre une seule dose de 1 g.

L'azithromycine est offerte sous forme de comprimés à 250 mg ou 600 mg, et sous forme de suspension orale.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 250 mg
- comprimé à 600 mg

_____comprimé(s) (_____mg) une fois par jour _____jour(s) par semaine

ou

- suspension orale à 20 mg / mL
- suspension orale à 40 mg / mL

_____mL (_____mg) une fois par jour _____jour(s) par semaine

Les comprimés d'azithromycine peuvent être pris avec ou sans nourriture. Cependant, la suspension orale devrait être prise une heure avant un repas ou 2 heures après. Bien agiter le flacon de suspension orale d'azithromycine avant de prendre chaque dose.

Prendre l'azithromycine pour toute la durée du traitement prescrit. Si vous cessez de la prendre avant le délai prescrit, votre infection peut revenir. Si l'infection s'aggrave ou persiste, consultez votre médecin.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'azithromycine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'azithromycine est habituellement bien tolérée. À des doses élevées, elle peut causer de la **diarrhée, des nausées et des vomissements**. Si vous avez certains de ces effets indésirables et vous en êtes incommodé, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien qui pourra vous conseiller sur la manière d'y remédier.

De rares cas de **troubles auditifs temporaires** (surdité partielle, diminution de l'audition, bourdonnement d'oreilles), **d'éruptions cutanées** (plaques rouges sur la peau) et d'autres réactions allergiques ont été rapportés. Si ces symptômes se manifestent, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Le risque d'**augmentation des enzymes du foie**, signe indiquant des lésions au foie, est faible. Si vous devez prendre l'azithromycine pendant longtemps, votre médecin vérifiera tout changement de vos enzymes du foie dans votre sang.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Ce médicament peut habituellement être pris sans danger avec la majorité des autres médicaments. Cependant, vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez

commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Les médicaments pouvant influencer l'effet de l'azithromycine comprennent : **médicaments et antiacides à base d'aluminium et de magnésium [Amphogel®, Diovol®, Maalox® et la didanosine (Videx^{MC})]. Si vous devez prendre ces médicaments, veuillez les prendre une heure avant ou 2 heures après avoir pris l'azithromycine.**

Si vous avez des antécédents de maladie du foie (cirrhose, hépatite), veuillez en aviser votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des antécédents d'allergies à l'érythromycine ou à la clarithromycine, veuillez aviser votre médecin avant de prendre l'azithromycine.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés d'azithromycine doivent être gardés dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. La suspension orale d'azithromycine doit être gardée entre 5 et 30 °C. La suspension peut être gardée pendant 10 jours après sa préparation. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des

préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

Référence : Monographie de Zithromax^{MC} (azithromycine). Kirkland, Qc, Canada: Pfizer Canada Inc., 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

AZITHROMYCINE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***