

CLARITHROMYCINE

Autre NOM : Biaxin®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La clarithromycine est un médicament anti-infectieux (antibiotique) utilisé pour prévenir ou traiter l'infection à complexe *Mycobacterium avium* (MAC). La clarithromycine peut aussi être utilisée pour traiter d'autres sortes d'infections telles que la pneumonie bactérienne, la toxoplasmose, et les ulcères d'estomac / intestinaux causés par un organisme nommé *H.pylori*.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La dose de clarithromycine variera en fonction du type d'infection dont vous souffrez. Par exemple, la dose habituelle de clarithromycine utilisée pour **prévenir l'infection à MAC** est de 500 mg deux fois par jour.

Lorsqu'elle est utilisée en association avec d'autres médicaments pour le **traitement de l'infection à MAC**, sa dose habituelle est de 500 mg deux fois par jour.

Pour le traitement des ulcères d'estomac et intestinaux dus au *H. pylori*, la dose habituelle est de 500 mg deux fois par jour, en association avec deux autres médicaments.

Pour les pneumonies bactériennes, le médicament est généralement prescrit pendant 7 à 14 jours.

La clarithromycine est offerte sous forme de comprimés à 250 mg ou 500 mg, et sous forme de suspension orale.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 250 mg
- comprimé à 500 mg

____ comprimé(s) (____ mg) ____ fois par jour

ou

- suspension orale à 25 mg / mL

____ mL (____ mg) ____ fois par jour

La clarithromycine peut être prise avec ou sans nourriture. Bien agiter le flacon de suspension orale de clarithromycine avant de prendre chaque dose.

Prendre la clarithromycine pour toute la durée du traitement prescrit. Si vous cessez de la prendre avant le délai prescrit, votre infection peut revenir. Si l'infection s'aggrave ou persiste, consultez votre médecin.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de clarithromycine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La clarithromycine est habituellement bien tolérée. À des doses élevées, elle peut causer **de la diarrhée, des nausées et des vomissements**. Si vous avez certains de ces effets indésirables et en êtes incommodé, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien qui pourra vous conseiller sur la manière d'y remédier.

De rares cas de **troubles auditifs temporaires** (surdité partielle, diminution de l'audition, bourdonnement d'oreilles), **d'éruptions cutanées (plaques rouges sur la peau)** et d'autres réactions allergiques ont

été rapportées. Si ces symptômes se manifestent, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Le risque d'**augmentation des enzymes du foie**, signe indiquant des lésions au foie, est faible. Si vous devez prendre la clarithromycine pendant longtemps, votre médecin vérifiera tout changement des enzymes de votre foie.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la clarithromycine. De plus, la clarithromycine peut influencer l'effet d'autres médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Vous ne devriez PAS prendre les médicaments suivants :

- Astémizole (Hismanal®)
- Cisapride (Prepulsid®)
- Pimozide (Orap®)
- Terfénadine (Seldane®)

Médicaments devant être utilisés avec précaution ou nécessitant une modification de la dose :

- Carbamazépine (Tegretol®)
- Cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- Dihydroergotamine (Migranal®)

Digoxine (Lanoxin®)
Disopyramide (Rythmodan®)
Ergotamine (Cafergot®)
Lopinavir / ritonavir (Kaletra^{MC})
Midazolam (Versed®)
Ritonavir (Norvir® SEC)
Tacrolimus (Prograf®)
Théophylline (Theodur®, Quibron®,
Uniphyl®)
Triazolam (Halcion®)
Warfarine (Coumadin®)

Si vous avez des antécédents de maladie du foie (cirrhose, hépatite), veuillez en aviser votre médecin avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez PAS prendre de clarithromycine si vous êtes enceinte, sauf si votre médecin juge que les bienfaits l'emportent sur les risques. La sécurité de la clarithromycine durant l'allaitement n'a pas été déterminée. Veuillez discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

Si vous avez des antécédents d'allergies à l'érythromycine ou à l'azithromycine, veuillez aviser votre médecin avant de prendre la clarithromycine.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés et la suspension orale de clarithromycine doivent être gardés dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. La suspension orale de clarithromycine ne doit PAS être gardée au réfrigérateur. La suspension peut être gardée pendant 14 jours après sa préparation. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Biaxin® (clarithromycine). St-Laurent, Qc, Canada : Laboratoires Abbott Ltée, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

CLARITHROMYCINE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***