

CLINDAMYCINE

Autre NOM : Dalacin ® C

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La clindamycine est un antibiotique utilisé pour traiter divers types d'infections.

On peut l'administrer en association avec la primaquine pour traiter la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC). Cette association est habituellement utilisée pour les personnes ayant eu des effets indésirables avec des médicaments à base de sulfa tels que le triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX, Bactrim®, Septra®) ou la dapsonne. Cette association est une solution de rechange sûre et efficace.

La clindamycine peut aussi être administrée en association avec la pyriméthamine (Daraprim®) pour traiter la toxoplasmose (infection cérébrale rare et grave).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La clindamycine est offerte sous forme de capsules à 150 et à 300 mg et sous forme de solution orale (75 mg / 5 mL). Elle peut aussi être administrée par voie intraveineuse (i.v., c'est-à-dire dans les veines).

La dose habituelle de clindamycine pour le traitement par la bouche de la PPC est de 300 à 450 mg aux 6 heures pendant 21 jours. Par voie i.v., la dose recommandée est de 600 à 900 mg aux 6 heures ou 900 mg aux 8 heures.

La dose initiale de clindamycine pour le traitement de la toxoplasmose est de 600 mg aux 6 heures pendant 6 semaines. Cette dose peut ensuite être diminuée à 300 à 450 mg aux 6 heures ou à 450 mg aux 8 heures.

Votre médecin décidera la dose qui vous convient le mieux.

Votre dose est la suivante :

- capsule à 150 mg
- capsule à 300 mg

___capsules(___mg)___fois par jour

ou

- solution orale à 75 mg / 5 mL
- solution intraveineuse

___mL (___mg)___fois par jour

Les capsules et la solution orale de clindamycine peuvent être prises avec ou sans nourriture. Prendre avec de la nourriture pour minimiser les malaises d'estomac.

Les capsules de clindamycine devraient être prises avec un verre d'eau.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de clindamycine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre des doses de clindamycine, votre infection peut persister ou s'aggraver. Le cas échéant, vous devrez peut-être prendre d'autres médicaments. Il est donc très important de prendre la clindamycine pendant tout le traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La clindamycine est généralement bien tolérée. Ce médicament peut parfois causer certains effets indésirables, dont **une douleur abdominale, des nausées et des vomissements.**

De rares cas **d'éruptions cutanées (plaques rouges sur la peau) et de diarrhée** ont été observés avec la clindamycine. La diarrhée peut être grave. Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous présentez une éruption cutanée ou si vous avez des crampes abdominales et du sang ou du mucus dans les selles.

Des tests sanguins seront effectués pour vérifier les enzymes de votre foie et le nombre de globules blancs (cellules de votre sang qui aident à prévenir les infections bactériennes). En de rares occasions, ces valeurs peuvent devenir anormales lorsque vous recevez la clindamycine.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre la clindamycine, avisez votre médecin si vous êtes allergique à ce médicament ou si vous avez déjà eu des troubles sanguins, du foie ou aux reins.

La sécurité de la clindamycine n'a pas été déterminée durant la grossesse et l'allaitement. Veuillez discuter avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet. En général, l'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH en raison du risque de transmission du virus à votre enfant par le lait maternel.

La clindamycine peut interférer avec plusieurs médicaments. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les capsules de clindamycine et la solution orale doivent être conservées dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière, et hors de la portée des enfants. La solution orale de clindamycine peut être conservée pendant 14 jours après sa

préparation. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Dalacin® C (clindamycine). Mississauga, ON, Canada: Pharmacia Canada Inc., 2000. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

CLINDAMYCINE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***