

FAMCICLOVIR

Autre NOM : Famvir®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le famciclovir est un agent antiviral utilisé pour traiter les infections telles que l'herpès génital et le zona. L'herpès provoque de petites ampoules remplies de liquide qui deviennent des ulcères pouvant être douloureux ou pouvant causer des démangeaisons. Ces ampoules contiennent plusieurs particules infectieuses du virus de l'herpès. Le famciclovir empêche le virus de se propager, réduit le nombre d'ampoules douloureuses et accélère la guérison. Si vous commencez à prendre le famciclovir aussitôt que vous sentez le début d'une infection, il peut être possible d'empêcher les ampoules de se former. Il peut également être utilisé dans la prévention des infections récidivantes d'herpès génital.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le famciclovir est présenté sous forme de comprimés à 125 mg, 250 mg et 500 mg. La dose de famciclovir variera selon l'infection à traiter. La dose devra être ajustée si vous avez des problèmes aux reins.

La dose recommandée utilisée pour traiter les infections d'herpès récidivantes est de 125 mg deux fois par jour pendant 5 jours. Si vous avez le VIH, la dose recommandée est de 500 mg deux fois par jour pendant 7 jours.

La dose recommandée de famciclovir utilisée pour traiter le zona chez les adultes est de 500 mg trois fois par jour pendant 7 jours.

Dans les deux cas, le traitement doit être instauré aussitôt que possible après l'apparition des signes et des symptômes.

La dose recommandée pour prévenir les infections récidivantes d'herpès génital est de 250 mg deux fois par jour. Si vous avez le VIH, la dose recommandée est de 500 mg deux fois par jour.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 125 mg
- comprimé à 250 mg
- comprimé à 500 mg

_____comprimé (_____mg) _____ fois par jour

Vous pouvez prendre le famciclovir avec ou sans nourriture. Avalez chaque comprimé entier avec de l'eau. Ne pas le mâcher. Il est important de prendre tous les comprimés qui vous ont été prescrits même si vous commencez à vous sentir mieux.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose ?

Si vous oubliez de prendre une dose de famciclovir, prenez-la dès que possible, puis continuez de prendre votre médicament selon la dose habituelle. Si vous vous souvenez que vous avez oublié une dose 2 heures avant de prendre votre prochaine dose, ne doublez pas la dose. Continuez de prendre votre médicament selon la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables ?

Le famciclovir est généralement bien toléré. Des **nausées, vomissements, diarrhée, étourdissements ou maux de tête** peuvent se produire. Si ces effets se produisent et qu'ils sont incommodants, veuillez en aviser votre médecin ou votre pharmacien. Avisez immédiatement votre médecin si vous pensez que vous avez une **réaction allergique (plaques rouges sur la peau)** au famciclovir.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres précautions devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Les infections herpétiques provoquent des ampoules douloureuses sur la peau. Le liquide de ces ampoules contient le virus causant la maladie. Les infections peuvent facilement se propager. Si vous touchez vos ulcères sur la peau, lavez-vous les mains immédiatement. Évitez tout contact intime avec d'autres personnes lorsque la maladie est visible.

Mentionnez à votre médecin si vous avez eu une réaction allergique ou un effet indésirable à d'autres agents antiviraux comme le valacyclovir (Valtrex®), l'acyclovir (Zovirax®), le ganciclovir (Cytovene®), ou le valganciclovir (Valcyte^{MC}).

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du famciclovir. Le famciclovir peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin

et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est important de leur dire si vous prenez du probénécide (Benemid®), de la cimétidine (Tagamet®), des stéroïdes (p. ex. la prednisone) ou tout médicament anticancéreux avant de commencer à prendre le famciclovir.

Puisque le famciclovir est éliminé par les reins, il est important d'aviser votre médecin si vous avez des troubles aux reins avant de prendre ce médicament. N'oubliez pas de mentionner également à votre médecin si vous avez le VIH, le SIDA ou toute maladie de la moelle osseuse.

La sécurité du famciclovir n'a pas été établie durant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez discuter de vos préoccupations à ce sujet avec votre médecin ou votre pharmacien.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le famciclovir devrait être gardé dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. Ne pas garder dans la salle de bain ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce

médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Famvir® (famciclovir). Dorval, Qc, Canada : Novartis Pharmaceuticals Canada, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

FAMCICLOVIR

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***