

RALTÉGRAVIR

Autre NOM : Isentress®

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Le raltégravir est un agent antirétroviral (anti-HIV) qui est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH-1. Il est destiné à être utilisé dans le traitement des adultes qui ont déjà été traités et qui ont présenté une résistance à plusieurs agents antirétroviraux. Il agit en inhibant l'enzyme intégrase. Si vous prenez ce médicament en association avec d'autres agents antirétroviraux prescrits par votre médecin, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺), vous serez mieux protégé contre les infections et votre charge virale devrait diminuer parce que l'enzyme nécessaire à la production de nouveaux virus sera inhibée.

Le raltégravir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de raltégravir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose de raltégravir est de 400 mg deux fois par jour, avec ou sans nourriture. Le médicament doit être pris en association avec d'autres antirétroviraux.

Voici votre posologie :

400 mg (____ comprimé rose) deux fois par jour

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de raltégravir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de raltégravir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que le raltégravir cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables au raltégravir peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses de raltégravir peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre le raltégravir sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Certaines personnes qui prennent le raltégravir présentent des symptômes tels que : étourdissements, nausées, vomissements, diarrhée, fatigue, troubles du sommeil, éruption cutanée, toux et fièvre. Au début du traitement par le raltégravir, certains patients présentent une réponse inflammatoire ou des signes d'infection sous-jacente (pneumonie, herpès ou tuberculose). Si vous présentez des symptômes inhabituels, parlez-en à votre médecin ou pharmacien, car ils indiquent que vous avez besoin d'une évaluation et d'un traitement.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du raltégravir. De plus, le raltégravir peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels ou des drogues à usage récréatif (illégal) que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les doses de certains médicaments auront peut-être besoin d'être augmentées si vous prenez le raltégravir.

Vous ne devez PAS prendre le raltégravir si vous êtes enceinte. Veuillez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous souhaitez devenir enceinte bientôt. Un registre a été créé pour surveiller les patientes prenant le raltégravir pendant la grossesse. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte pour qu'il puisse vous inscrire à ce registre en composant le 1 800 567-2594. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

Le raltégravir doit être conservé dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

RALTÉGRAVIR
(Isentress^{MC})

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Référence : Monographie d'Isentress^{MC} (raltégravir). Kirkland (Québec), Canada : Merck Frosst Canada Ltée, 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca