

TIPRANAVIR

Autre NOM : Aptivus®

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Le tipranavir est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des **inhibiteurs de la protéase**. Les inhibiteurs de la protéase agissent à une étape de la reproduction du virus différente de celle des autres catégories de médicaments disponibles auparavant pour combattre le VIH. Le tipranavir est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺) et vous serez mieux protégé contre les infections.

Le tipranavir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de tipranavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

Le tipranavir est présenté sous forme de capsules de gélatine molle à 250 mg. La dose recommandée de tipranavir est de 500 mg (2 capsules à 250 mg) deux fois par jour en association avec le ritonavir à 200 mg (2 x 100 mg) deux fois par jour. Le tipranavir doit être pris avec de la nourriture pour réduire le risque de nausées et vomissements.

Voici votre posologie :

capsule rose de gélatine molle à 250 mg

____ capsules (____ mg) ____ fois par jour

Les capsules doivent être avalées entières, sans les mâcher, avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée. Vous devriez éviter de boire des quantités excessives d'alcool pendant votre traitement.

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de tipranavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de tipranavir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que le tipranavir cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables au tipranavir **peuvent aussi devenir inefficaces. Par conséquent, le fait d'oublier des doses de tipranavir peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devez toujours prendre vos doses de tipranavir. N'arrêtez pas de prendre le tipranavir sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Les effets indésirables signalés le plus couramment sont légers à modérés. Ils comprennent : **faiblesse ou fatigue, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, maux de tête et étourdissements.** Si ces effets se manifestent et sont incommodants, veuillez appeler la clinique ou en parler lors de votre prochaine visite.

Des tests sanguins seront effectués régulièrement afin de détecter tout changement dans la fonction de votre foie et de votre pancréas. Votre médecin effectuera aussi des tests pour déceler toute augmentation de vos taux de cholestérol, de triglycérides et de glycémie.

Les effets à long terme du tipranavir sont inconnus pour l'instant. Des études sont présentement en cours. Une prise anormale de poids et des changements dans la forme du corps ont été signalés avec d'autres inhibiteurs de la protéase. Il n'est pas certain que le tipranavir cause ces changements.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses de tipranavir plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses de tipranavir plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant au tipranavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du tipranavir. De plus, le tipranavir peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les médicaments suivants ne doivent PAS être pris avec le tipranavir :

- Amiodarone (Cordarone®)
- Delavirdine (Rescriptor®)
- Dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine [Cafergot®, Bellergal®, Ergodryl^{MC}, Gravergol®], ergonovine, dihydroergotamine [Migranal^{MD}], méthylergonovine [Methergine®])
- Flécaïnide (Tambacor^{MC})
- Lovastatine (Mevacor®)
- Midazolam (Versed®)
- Pimozide (Orap®)
- Propafénone (Rythmol®)
- Quinidine (Biquin Durules®)
- Rifampine (p. ex., Rifadin®, Rimactane®, Rofact®)
- Simvastatine (Zocor®)
- Triazolam (Halcion®)
- Vardénafil (Levitra®)

Veillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments mentionnés ci-dessus pour qu'il puisse vous prescrire un autre médicament.

Le tipranavir ne devrait pas être pris en même temps que des antiacides tels que TUMS[®], Roloids[®], Maalox[®], etc. Si vous devez prendre ces médicaments, prenez-les 1 heure avant ou 2 heures après le tipranavir.

On ignore si le tipranavir peut avoir un effet sur l'efficacité des contraceptifs oraux ou d'autres hormones utilisées pour éviter la grossesse. Une deuxième méthode de contraception doit **toujours** être utilisée. En général, même si vous ne prenez pas de tipranavir, l'emploi de condoms est toujours recommandé pour réduire le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

L'innocuité du tipranavir pendant la grossesse n'a pas été établie. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

Les capsules de tipranavir doivent être conservées dans leur contenant original au réfrigérateur (2 à 8 °C). Une fois ouvert, le flacon peut être conservé à température ambiante (25 °C) pendant 60 jours à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver ce médicament dans la salle de bains ni près de la cuisinière, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins efficace et les capsules élastiques molles risquent de coller ensemble.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

TIPRANAVIR

(Aptivus[®])

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***

Référence : Monographie d'Aptivus[®] (tipranavir). Burlington (Ontario), Canada : Boehringer Ingelheim Ltée, 2009. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2009.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca